

Tratamiento con amoxicilina Amoxicillin Treatment

La amoxicilina es un antibiótico oral para el tratamiento de infecciones de transmisión sexual.

Alergias

Allergies

- Informe a su proveedor de atención médica si tiene alguna alergia a cualquier antibiótico de la familia de las penicilinas, como amoxicilina, penicilina-V-K o a antibióticos de la familia de las cefalosporinas, como cefixima (Suprax[®]), cefaexina, cefaclor.

Embarazo/Lactancia

Pregnancy/Breastfeeding

- La amoxicilina puede usarse durante el embarazo y la lactancia. Por favor consulte a su médico.

ATENCIÓN

CAUTION

- Deje que pasen 24 horas o más entre la administración de la última dosis de amoxicilina y la vacuna oral contra la fiebre tifoidea (Vivotif[®])
- **Tenga en cuenta que los medicamentos intravenosos no están incluidos en este documento. Si está recibiendo algún medicamento administrado por vía intravenosa, avísele a su profesional de la salud.**

Informe a su médico si está tomando los siguientes medicamentos

Tell your doctor if you are taking the following medications

- **Anticoagulantes (Anticoagulants):** Warfarin (Coumadin[®])
- **Antidepresivos/Ansiolíticos (Antidepressant/Anxiolytic):** Venlafaxine (Effexor[®] XR)
- **Píldoras anticonceptivas (Birth control pills)** (estrógenos/progestágenos)
- **Gota/Artritis gotosa (Gout/Gouty arthritis):** Probenecid (Benuryl[®])
- **Inmunosupresores (Immunosuppressant):** Methotrexate (Rheumatrex[®])

Efectos secundarios

Side Effects

- Podría experimentar diarrea, náusea, dolor abdominal o vómito.
- Obtenga ayuda urgente si tiene alguna de las siguientes señales de una reacción alérgica: urticaria, dificultad para respirar, hinchazón del rostro, labios, lengua y garganta.

Instrucciones para su uso

Instructions for Taking

- Tome **UNA** (500 mg) cápsula tres veces al día con o sin alimentos hasta que se las termine.
- Si se le olvida tomar una dosis, tómese esa dosis tan pronto como se acuerde, pero si ya casi es hora de su siguiente dosis, sáltese la dosis que olvidó. No tome una dosis doble.

Tratamiento con amoxicilina (continuación)

Amoxicillin Treatment (cont'd)

Instrucciones de almacenaje

Storage Instructions

- Almacenar a temperatura ambiente entre 15 y 30 °C.
- Proteger de la luz, el calor y la humedad.
- No consumir los medicamentos después de la fecha de caducidad impresa.
- Mantener fuera del alcance de los niños.

Instrucciones especiales

Special Instructions

- No tenga relaciones sexuales hasta:
 - una semana después de su tratamiento de 1 día; o
 - que su tratamiento de 7 días haya terminado, y
 - que su(s) pareja(s) sexual(es) también haya(n) recibido tratamiento, aunque los resultados de su prueba hayan sido negativos.
- Hable con su proveedor de atención médica si:
 - tiene relaciones sexuales con una pareja que no haya recibido tratamiento o
 - tiene relaciones sexuales antes de que usted o su(s) pareja(s) terminen el tratamiento.
- Si está usando un método anticonceptivo hormonal (comprimidos orales, aro o parche), use un método anticonceptivo adicional no hormonal (es decir, condón/diafragma) hasta que haya completado su ciclo actual.

La prueba de cura para la clamidia debe hacerse entre 3 y 4 semanas después de la conclusión del tratamiento.

Si tiene alguna pregunta o si necesita mayor información, por favor contacte a su médico, unidad local de salud, o vea la información que se encuentra al calce.