



Tratamiento con cefixima Cefixime Treatment

La cefixima (Suprax[®]) es un antibiótico oral que se usa para el tratamiento de infecciones de transmisión sexual.

Alergias Allergies

- Informe a su proveedor de atención médica si tiene alguna alergia a cualquier antibiótico de la familia de las penicilinas, como la penicilina-V-K, amoxicilina o cualquier antibiótico de la familia de las cefalosporinas, como cefixima (Suprax[®]), Cephalexin, Cefaclor.

Embarazo/Lactancia Pregnancy/Breastfeeding

- La cefixima puede usarse con cautela durante el embarazo. Por favor consulte a su médico.
- Use cefixima con cautela durante la lactancia ya que su uso puede tener como consecuencia la sensibilización alérgica del bebé.

ATENCIÓN CAUTION

- Deje que pasen 24 horas o más entre la administración de la última dosis de cefixima y la vacuna oral contra la fiebre tifoidea (Vivotif[®])
- **Tenga en cuenta que los medicamentos intravenosos no están incluidos en este documento. Si está recibiendo algún medicamento administrado por vía intravenosa, avísele a su profesional de la salud.**

Informe a su médico si está tomando los siguientes medicamentos Tell your doctor if you are taking the following medication

- **Píldoras anticonceptivas (Birth control pills)** (estrógenos/progestágenos)
- **Gota/Artritis gotosa (Gout/Gouty arthritis):** Probenecid (Benuryl[®]).

Efectos secundarios Side Effects

- Podría experimentar diarrea, náusea, dolor abdominal, vómito, dolor de cabeza o mareo.
- Si tiene alguna reacción después del tratamiento (por ejemplo: urticaria, dificultad para respirar, hinchazón del rostro, labios, lengua y garganta), por favor busque ayuda médica urgente de inmediato.

Instrucciones para su uso Instructions for Taking

- Tome el (los) comprimido(s) al mismo tiempo como dosis única.
- La cefixima puede tomarse con alimentos para disminuir la probabilidad de molestias estomacales.

Tratamiento con cefixima (continuación)

Cefixime Treatment (cont'd)

Instrucciones de almacenaje

Storage Instructions

- Almacenar a temperatura ambiente entre 15 y 30 °C.
- Proteger de la luz, el calor y la humedad.
- No consumir los medicamentos después de la fecha de caducidad impresa.
- Mantener fuera del alcance de los niños.

Instrucciones especiales

Special Instructions

- No tenga relaciones sexuales hasta:
 - una semana después de su tratamiento de 1 día; o
 - que su tratamiento de 7 días haya terminado, y
 - que su(s) pareja(s) sexual(es) también haya(n) recibido tratamiento, aunque los resultados de su prueba hayan sido negativos.
- Hable con su proveedor de atención médica si:
 - tiene relaciones sexuales con una pareja que no haya recibido tratamiento o
 - tiene relaciones sexuales antes de que usted o su(s) pareja(s) terminen el tratamiento.
- Si está usando un método anticonceptivo hormonal (comprimidos orales, aro o parche), use un método anticonceptivo adicional no hormonal (es decir, condón/diafragma) hasta que haya completado su ciclo actual.

Si tiene alguna pregunta o si necesita mayor información, por favor contacte a su médico, unidad local de salud, o vea la información que se encuentra al calce.