

Cefixime Treatment 頭孢克肟治療

頭孢克肟抗生素（Cefixime 如 Suprax[®]）屬於抗生素，經口服用於治療性病。

過敏 Allergies

- 如果你对任何青黴素類抗生素（penicillin antibiotic）過敏，如：青黴素 V-K（Penicillin-V-K）、阿莫西林（Amoxicillin），或任何頭孢菌素類抗生素（cephalosporin antibiotic），如：頭孢克肟（Cefixime 如 Suprax[®]）、頭孢氨苄（Cephalexin）、頭孢克洛（Cefaclor）等，請告訴醫護人員。

懷孕或哺乳期間 Pregnancy/Breastfeeding

- 在懷孕期間，可慎用頭孢克肟。請向醫生諮詢。
- 在哺乳期間，應慎用頭孢克肟，因為服用此藥可能會導致胎兒變得過敏（allergic sensitization）。

注意事項 CAUTION

- 在服用最後一劑頭孢克肟和口服傷寒疫苗（Typhoid Vaccine 如 Vivotif[®]）之間，請間隔 24 小時或以上。
- 請注意。本文未列出透過靜脈用藥。如果你正在使用此類藥物，請通知醫護人員。

如果你正在服用以下藥物，請告訴醫生

Tell Your doctor if you are taking the following medication

- 避孕藥 (Birth Control Pills) (雌激素 <Estrogens>, 或黃體素 <Progestogens>)
- 痛風藥 (Gout) 或痛風性關節炎藥 (Gouty Arthritis): Probenecid (Benuryl[®])

副作用 Side Effects

- 你可能會出現腹瀉、腹痛、頭痛或頭暈等徵狀。
- 如果你在接受治療後，出現任何反應（例如：蕁麻疹、呼吸困難、臉部、嘴唇、舌頭和喉嚨腫脹），請即時尋求緊急醫療援助。

服藥說明 Instructions for Taking

- 單劑藥量包括數片藥片，請同時服用。
- 頭孢克肟可與食物同服，以減少胃部不適的機會。

儲存說明 Storage Instructions

- 存於攝氏 15-30° 之間的室溫。
- 避光、防熱、防潮。
- 不要服用過期的藥物。
- 避免兒童觸及。

Cefixime Treatment (cont'd)

頭孢克肟治療（續前頁）

特別說明 **Special Instructions**

- 禁性生活，直至：
 - 在完成一天療程後的一週，或
 - 完成七天的療程，以及
 - 即使你的性伴侶（們）測試結果呈陰性，該伴侶（這些伴侶）也已接受了治療。
- 如果有以下情況，請告訴醫護人員：
 - 你與未接受治療的伴侶（們）有性生活，或
 - 在你或你的性伴侶（們）完成治療之前，你有了性生活。
- 如果你正在用荷爾蒙（口服避孕藥、子宮環或避孕貼片）方式避孕，另請再用非荷爾蒙避孕方式避孕（例如：安全套或避孕膜），直到你現在的週期結束。

如果你有任何疑問或需要更多的信息，請聯絡醫生、本地的醫療機構，或參閱以下聯絡資料。