

Tratamiento con ciprofloxacina Ciprofloxacin Treatment

La ciprofloxacina es un antibiótico oral para el tratamiento de infecciones de transmisión sexual.

Alergias

Allergies

- Informe a su proveedor de atención médica si tiene alergia a algún antibiótico de la familia de las quinolonas como ciprofloxacina (Cipro[®]), Levofloxacin (Levaquin[®]), Ofloxacin (Floxin[®]) or Moxifloxacin (Avelox[®]).

Embarazo/Lactancia

Pregnancy/Breastfeeding

- La ciprofloxacina **no** debe usarse durante el embarazo.
- La ciprofloxacina puede usarse con cautela durante la lactancia. Si deja de amamantar mientras toma ciprofloxacina, empiece a amamantar 48 horas después de su última dosis para permitir que el fármaco abandone su cuerpo. Por favor consulte a su médico.

ATENCIÓN

CAUTION

- **Tenga en cuenta que los medicamentos intravenosos no están incluidos en este documento. Si está recibiendo algún medicamento administrado por vía intravenosa, avísele a su profesional de la salud.**
- **No tome antiácidos que contengan aluminio y magnesio** (Tums[®], Amphojel[®], Maalox[®]), Didanosine (Videx[®]), Sucralfate (Sulcrate[®]), **complementos de calcio, complementos de hierro, multivitamínicos que contengan hierro y cinc** al mismo tiempo que la ciprofloxacina. Deje un lapso de tiempo de seis horas antes o dos horas después de tomar la dosis de ciprofloxacina.
- **No tome productos lácteos** al mismo tiempo que la ciprofloxacina. Tome productos lácteos dos horas antes o dos horas después de tomar la ciprofloxacina.
- Evite la exposición a la luz solar o los rayos UV artificiales (lámparas de sol o camas de bronceado). La ciprofloxacina puede hacer que su piel sea más sensible y podría sufrir quemaduras solares. Use un filtro solar (FPS mínimo de 15) y use ropa protectora si tiene que estar bajo el sol.
- Permita que pasen 24 horas o más entre la administración de la dosis de ciprofloxacina y la vacuna oral contra la fiebre tifoidea (Vivotif[®]).

Informe a su médico si está tomando los siguientes medicamentos

Tell your doctor if you are taking the following medications

- **Medicamentos antiarrítmicos (Antiarrhythmic medication):** Amiodarone (Cordarone[®]), Bretylium, Disopyramide (Rythmodan[®]), Procainamide (Procan[®]), Propafenone (Rythmol[®]), Quinidine, Sotalol
- **Anticoagulantes (Anticoagulants):** Warfarin (Coumadin[®])
- **Asma (Asthma):** Aminophyllines (Phyllocontin[®]), Oxtriphylline (Choledyl[®]), Theophylline (Uniphyll[®])
- **Píldoras anticonceptivas (Birth control pills) (estrógenos/progestágenos)**

Tratamiento con ciprofloxacina (continuación)

Ciprofloxacin Treatment (cont'd)

Efectos secundarios

Side Effects

- Podría experimentar diarrea, náusea, dolor abdominal, vómito, dolor de cabeza, somnolencia o mareo.
- Informe a su médico si siente inflamación dolorosa en las articulaciones.
- Si tiene alguna reacción después del tratamiento (por ejemplo: urticaria, dificultad para respirar, hinchazón del rostro, labios, lengua y garganta), busque de inmediato atención médica urgente.

Instrucciones para su uso

Instructions for Taking

- Tome un comprimido como dosis única.
- La ciprofloxacina puede tomarse con o sin alimentos.
- Evite tomarla junto con productos lácteos (p. ej., leche o yogurt) ya que estos productos podrían hacer que el medicamento sea menos efectivo.
- Tome el comprimido con un vaso entero de agua (8 oz).
- Evite la cafeína ya que la ciprofloxacina puede hacer que el efecto de la cafeína sea más fuerte.

Instrucciones de almacenaje

Storage Instructions

- Almacenar a temperatura ambiente entre 15 y 30 °C.
- Proteger de la luz, el calor y la humedad.
- No consumir los medicamentos después de la fecha de caducidad impresa.
- Mantener fuera del alcance de los niños.

Instrucciones especiales

Special Instructions

- No tenga relaciones sexuales hasta:
 - una semana después de su tratamiento de 1 día; o
 - que su tratamiento de 7 días haya terminado, y
 - que su(s) pareja(s) sexual(es) también haya(n) recibido tratamiento, aunque los resultados de su prueba hayan sido negativos.
- Hable con su proveedor de atención médica si:
 - tiene relaciones sexuales con una pareja que no haya recibido tratamiento o
 - tiene relaciones sexuales antes de que usted o su(s) pareja(s) terminen el tratamiento.
- Si está usando un método anticonceptivo hormonal (comprimidos orales, aro o parche), use un método anticonceptivo adicional no hormonal (es decir, condón/diafragma) hasta que haya completado su ciclo actual.

Prueba de cura

Test of cure

- Si se usa para la gonorrea, hágase otra prueba no antes de 4 a 6 semanas después de tomar el tratamiento.

Si tiene alguna pregunta o si necesita mayor información, por favor contacte a su médico, unidad local de salud, o vea la información que se encuentra al calce.