

Điều Trị bằng Ciprofloxacin (Ciprofloxacin Treatment)

Ciprofloxacin là thuốc trụ sinh uống để điều trị các bệnh lây qua đường tình dục).

Các Chứng Dị Ứng (Allergies)

- Hãy cho chuyên viên chăm sóc sức khỏe biết nếu quý vị bị dị ứng với bất cứ thuốc trụ sinh loại quinolone nào như Ciprofloxacin (Cipro[®]), Levofloxacin (Levaquin[®]), Ofloxacin (Floxin[®]), hoặc Moxifloxacin (Avelox[®]).

Có Thai/Cho Con Bú Sữa Mẹ (Pregnancy/Breastfeeding)

- Không** nên uống Ciprofloxacin trong thời gian có thai.
- Nên thận trọng khi dùng Ciprofloxacin trong thời gian cho con bú sữa mẹ. Nếu quý vị ngưng cho con bú sữa mẹ trong khi đang dùng Ciprofloxacin, hãy cho bú 48 tiếng sau khi quý vị uống liều thuốc cuối cùng để cơ thể có thời gian thải hết chất thuốc. Xin hỏi bác sĩ của quý vị.

THẬN TRỌNG (CAUTION)

- Xin lưu ý là các loại thuốc truyền qua tĩnh mạch không được liệt kê trong tài liệu này. Nếu quý vị có dùng bất cứ loại thuốc nào truyền qua tĩnh mạch, xin thông báo cho bác sĩ của quý vị.**
- Đừng dùng các loại kháng acid (antacids) có chất nhôm và magnesium** (Tums[®], Amphojel[®], Maalox[®]), Didanosine (Videx[®]), Sucralfate (Sulcrate[®]), **thuốc tăng cường chất vôi, tăng cường chất sắt, thuốc đa sinh tố (multivitamin) có chất sắt và chất kẽm** cùng lúc với Ciprofloxacin. Dùng các loại thuốc này sáu tiếng trước hoặc hai tiếng sau khi uống một liều Ciprofloxacin.
- Đừng dùng các sản phẩm sữa** cùng lúc với Ciprofloxacin. Dùng các sản phẩm sữa hai tiếng trước hoặc hai tiếng sau khi uống Ciprofloxacin.
- Tránh tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng hoặc tia UV nhân tạo (đèn phơi nắng hoặc giường làm nâu da). Ciprofloxacin có thể khiến da quý vị nhạy cảm hơn và có thể bị râm nắng. Hãy dùng thuốc chống nắng (SPF tối thiểu 15) và mặc quần áo bảo vệ nếu quý vị phải ra ngoài nắng.
- Nếu phải uống thuốc ngừa thương hàn có vi trùng sống (Vivotif[®]) thì uống cách liều Ciprofloxacin ít nhất 24 giờ

Hãy cho bác sĩ biết nếu quý vị đang dùng các loại thuốc sau đây (Tell your doctor if you are taking the following medications)

- Thuốc Trị Loạn Nhịp Tim:** Amiodarone (Cordarone[®]), Bretylium, Disopyramide (Rythmodan[®]), Procainamide (Procan[®]), Propafenone (Rythmol[®]), Quinidine, Sotalol
- Thuốc Chống Đông Máu:** Warfarin (Coumadin[®])
- Suyễn:** Aminophyllines (Phyllocontin[®]), Oxtriphylline (Choledyl[®]), Theophylline (Uniphyll[®])
- Thuốc Viên Ngừa Thai (Estrogens/Progestogens)**

Điều Trị bằng Ciprofloxacin (tiếp theo)

(Ciprofloxacin Treatment) (cont'd)

Các Tác Dụng Phụ (Side Effects)

- Quý vị có thể bị tiêu chảy, buồn nôn, đau bụng dưới, nôn mửa, nhức đầu, buồn ngủ hoặc chóng mặt.
- Cho bác sĩ biết nếu quý vị bị sưng khớp đau đớn.
- Nếu quý vị bị bất cứ phản ứng nào sau khi điều trị (thí dụ: phát ban, khó thở, sưng mặt, môi, lưỡi và cổ họng), xin nhờ trợ giúp cấp cứu y tế ngay.

Chỉ Dẫn Cách Dùng (Instructions for Taking)

- Uống liều duy nhất một viên.
- Có thể uống Ciprofloxacin khi bụng no hoặc đói.
- Tránh dùng thuốc với các sản phẩm sữa (chẳng hạn như sữa hoặc da ua) vì các sản phẩm này có thể làm cho thuốc kém hiệu quả.
- Uống thuốc với một ly nước đầy (8 oz).
- Tránh chất caffeine vì Ciprofloxacin có thể làm tăng tác dụng của chất caffeine.

Chỉ Dẫn Cách cất Thuốc (Storage Instructions)

- Cất ở nhiệt độ trong phòng từ 15-30°C.
- Bảo vệ để thuốc không tiếp xúc với ánh sáng, hơi nóng, và ẩm ướt.
- Đừng dùng thuốc khi đã quá hạn in trên nhãn.
- Cất xa tầm với của trẻ em.

Chỉ Dẫn Đặc Biệt (Special Instructions)

- Đừng làm tình mà hãy chờ cho đến:
 - một tuần sau khi xong chương trình điều trị 1 ngày của quý vị; hoặc
 - chương trình điều trị 7 ngày của quý vị đã hoàn tất, và
 - (những) người bạn tình của quý vị cũng đã được điều trị, dù kết quả thử nghiệm của họ là không bị nhiễm.
- Hãy cho chuyên viên chăm sóc sức khỏe biết nếu:
 - quý vị làm tình với một người bạn tình chưa được điều trị hoặc
 - quý vị làm tình trước khi hoàn tất chương trình điều trị của quý vị hoặc (những) người bạn tình của quý vị.
- Nếu quý vị đang dùng loại ngừa thai bằng kích thích tố (thuốc uống, vòng, hoặc miếng dán), hãy dùng thêm một phương pháp ngừa thai không bằng kích thích tố (chẳng hạn như bao cao su/màng chắn) cho đến khi dứt kinh kỳ hiện nay của quý vị.

Thử xem có lành chưa (Test of cure)

- Nếu dùng để trị Bệnh Lậu, hãy thử nghiệm lại 4-6 tuần sau khi điều trị.

Nếu quý vị có bất cứ thắc mắc gì hoặc cần thêm chi tiết, xin liên lạc với bác sĩ, trạm y tế địa phương, hoặc xem chi tiết liên lạc dưới đây.