



Tratamiento con medroxiprogesterona (Depo-Provera[®]) Medroxyprogesterone (Depo-Provera[®]) Treatment

La medroxiprogesterona (Depo-Provera[®]) es una forma de progesterona que se administra mediante una inyección intramuscular para la prevención del embarazo.

Alergias Allergies

- Informe a su proveedor de atención médica si tiene alguna alergia a Provera[®] o medroxyprogesterone acetate (formas genéricas).

Embarazo/Lactancia Pregnancy/Breastfeeding

- La medroxiprogesterona no debe usarse durante el embarazo
- La medroxiprogesterona puede usarse durante la lactancia
- Asegúrese de no estar embarazada antes de la primera dosis
- Inicie el tratamiento durante los primeros 5 días de su ciclo menstrual normal, a las seis semanas del parto en mujeres que amamantan o dentro de los 5 días posteriores al parto en mujeres que no amamantan.

ADVERTENCIA CAUTION

- **No se pueden tomar los siguientes medicamentos en conjunto con Depo-Provera[®]:**
 - Aminoglutethimide (Cytadren[®])
- Cuando se usa como anticonceptivo a largo plazo (> 2 años), puede tener como resultado, con la creciente duración de la terapia, un aumento de la pérdida de densidad mineral ósea (DMO). Evalúe la densidad mineral ósea de manera periódica y asegúrese de ingerir calcio y vitamina D de manera adecuada.
- Evite fumar debido al mayor riesgo de ataques cardíacos.
- **Informe a su médico si está tomando Rifampin (Rifadin[®]).**

Efectos secundarios Side Effects

- Podría experimentar irregularidades menstruales (ausencia de menstruación, sangrado poco frecuente), dolor abdominal, cambios en el peso, mareo, dolor de cabeza, sensibilidad en los senos o nerviosismo.

Cuidados después del tratamiento

- Por favor permanezca en la clínica 15 minutos después de su tratamiento.
- Si tiene alguna reacción después del tratamiento (por ejemplo: salpullido, comezón, dificultad para respirar), por favor avise de inmediato a un miembro del personal.
- Si ocurren estos síntomas después de abandonar la clínica, por favor busque de inmediato ayuda urgente.

Tratamiento con medroxiprogesterona (Depo-Provera[®]) (continuación) Medroxyprogesterone (Depo-Provera[®]) Treatment (cont'd)

Instrucciones de almacenaje

Storage Instructions

- Almacenar a temperatura ambiente entre 15 y 30 °C.
- Proteger de la luz, el calor y la humedad.
- No consumir los medicamentos después de la fecha de caducidad impresa.
- Mantener fuera del alcance de los niños.

Instrucciones especiales

Special Instructions

- Si está cambiando de otra forma de anticonceptivo hormonal (comprimidos orales, aro o parche), empiece 7 días después del último método hormonal (comprimido oral, aro o parche). Es importante que cada inyección se aplique en intervalos de exactamente 3 meses.
- La medroxiprogesterona no protege contra el VIH u otras enfermedades de transmisión sexual.
- Si la dosis inicial se aplica dentro de los primeros 5 días del ciclo menstrual normal, es efectiva desde el día en que se aplicó la inyección. Si la dosis se aplica cuando el ciclo está más avanzado, puede no ser efectiva durante 3-4 semanas. Use un método anticonceptivo adicional no hormonal (es decir, condón, diafragma) hasta que termine su ciclo actual.

Si tiene alguna pregunta o si necesita mayor información, por favor contacte a su médico, unidad local de salud, o vea la información que se encuentra al calce.