



Doxycycline Treatment 强力霉素治疗

强力霉素 (Doxycycline) 属于抗生素，经口服用于治疗性病。

过敏 Allergies

- 如果你对任何四环素类抗生素 (Tetracycline antibiotic) 过敏，如：强力霉素、二甲胺四环素 (Minocycline)、或四环素 (Tetracycline) 等，请告诉医护人员。
- 如果你对亚硫酸盐 (sulfite, 即防腐剂) 过敏，忌用强力霉素。

怀孕或哺乳期间 Pregnancy/Breastfeeding

- 在怀孕期，服用强力霉素不安全。
- 在哺乳期，短期服用强力霉素一般被认为是适宜的，即在哺乳期对婴儿的风险较低。请咨询医生咨询。
- 在哺乳期，应避免长期服用强力霉素，这是因为婴儿会通过母乳间接吸收这些抗生素，并在幼儿期呈现毒性 (例如：牙斑、骨骼生长降低)。

注意事项 CAUTION

- 如果你患有重症肌无力 (一种神经肌障碍症) (myasthenia gravis)，请勿服用强力霉素。
- 请注意，本文未列出静脉药物。如果你在用此类药物，请通知医护人员。
- 在服用强力霉素时，请勿同时服用补铁剂 (iron supplements)、补钙剂 (calcium supplements)、含铝 (aluminum) 和镁 (magnesium) 的解酸药 (antacids) 或碱式水杨酸铋 (Bismuth Subalicylates, 如 Pepto Bismol[®])。请在服用这些药品两小时之前或服用之后六小时，服用强力霉素。
- 避免阳光照射或人工紫外线 (太阳灯或日光浴床)。强力霉素会使皮肤变得更敏感，并可能会晒伤。要使用防晒霜 (防晒指数至少为 15)，如果你必须要到户外阳光下，则要穿衣服保护皮肤。
- 在服用强力霉素时，不可同时服用以下药物：
 - 口服伤寒疫苗 (Typhoid Vaccine)：(Vivotif[®])
 - 牛皮癣药 (Psoriasis)：Acitretin (Soriatane[®])
 - 其他药物：Isotretinoin (Accutane[®])

如果你正在服用以下药物，请告诉医生

Tell your doctor if you are taking the following medications

- 抗心律不齐药 (Antiarrhythmics)：Digoxin (Lanoxin[®])
- 抗生素：Rifampin (Rifadin[®]、Rofact[®])

Doxycycline Treatment (cont'd)

强力霉素治疗 (续前页)

如果你正在服用以下药物，请告诉医生

Tell your doctor if you are taking the following medications

- 抗凝血剂 (Anticoagulants) : Warfarin (Coumadin®)
- 抗惊厥类药 (Anticonvulsants) : Carbamazepine (Tegretol®)、Phenytoin (Dilantin®)
- 抗高血压药物 (Antihypertensive) : Quinapril (Accupril®)
- 巴比妥盐 (Barbituates) : Pentobarbital、Phenobarbital、Secobarbital
- 避孕药 (雌性激素类 <Estrogens>, 或孕激素类 <Progestogens>)
- 免疫抑制剂 (Immunosuppressant) : Methotrexate (Folex®)
- 青霉素 (Penicillins) : (Amoxil®)、Penicillin V (Pen-VK®)

副作用 Side Effects

- 你可能会出现腹泻、恶心、腹痛、呕吐、头痛或皮疹等症状。

服药说明 Instructions for Taking

- 早晚各服一粒胶囊 (100 毫克)，与食物同服。
- 吞服整粒胶囊。
- 请勿碾碎、咀嚼或打开胶囊。
- 喝一大杯水服药，并且保持站立或坐直的姿势至少 30 分钟。

贮藏说明 Storage Instructions

- 存于 15-30°C 之间的室温。
- 避光、防热、防潮。
- 不要服用过期的药物。
- 避免儿童触及。

特别说明 Special Instructions

- 禁性生活，直至：
 - 在完成一天疗程后的一周，或
 - 完成七天的疗程，以及
 - 即使你的性伴侣 (们) 检测结果呈阴性，该伴侣 (这些伴侣) 也已接受了治疗。
- 如果有以下情况，请告诉医护人员：
 - 你与未接受治疗的伴侣 (们) 有性生活，或
 - 在你或你的性伴侣 (们) 完成治疗之前，你有了性生活。
- 如果你正在用荷尔蒙避孕方式 (口服避孕药、上环或避孕贴片)，另请再用非荷尔蒙避孕方式 (例如：安全套或避孕膜)，直到你现在的周期结束。

如果你有任何疑问或需要更多的信息，请联系医生、当地的医疗机构，或请参阅下面的联系方式。