

Tratamiento con doxiciclina Doxycycline Treatment

La doxiciclina es un antibiótico oral para el tratamiento de infecciones de transmisión sexual.

Alergias Allergies

- Informe a su proveedor de atención médica si tiene alguna alergia a cualquier antibiótico del grupo de las tetraciclinas, como la doxiciclina, minociclina o tetraciclina.
- No tome doxiciclina si tiene alergia a los sulfitos (conservadores).

Embarazo/Lactancia Pregnancy/Breastfeeding

- La doxiciclina **no** debe usarse durante el embarazo.
- Si se usa a corto plazo, la doxiciclina por lo general se considera compatible con la lactancia, es decir, es de bajo riesgo para el bebé durante la lactancia. Consulte a su médico.
- Se debe evitar el uso a largo plazo durante la lactancia debido a la absorción por parte de los bebés y la toxicidad en los niños (p, ej., manchas en los dientes, menor crecimiento de los huesos).

ADVERTENCIA CAUTION

- **No puede tomar doxiciclina si tiene miastenia gravis** (un trastorno neuromuscular).
- **Tenga en cuenta que los medicamentos intravenosos no están incluidos en este documento. Si está recibiendo algún medicamento administrado por vía intravenosa, avísele a su profesional de la salud.**
- **No tome complementos de hierro, complementos de calcio, antiácidos con aluminio o magnesio o subsalicilato de bismuto** (Pepto Bismol[®]) al mismo tiempo que la doxiciclina. Tome la doxiciclina dos horas antes o seis horas después de tomar estos productos.
- Evite la exposición a la luz solar o a los rayos UV artificiales (lámparas de sol o camas de bronceado). La doxiciclina puede hacer su piel más sensible y podría sufrir una quemadura solar como resultado. Use un filtro solar (FPS mínimo de 15) y use ropa protectora si tienen que estar bajo el sol.
- **No se pueden tomar los siguientes medicamentos en conjunto con la doxiciclina**
 - **Vacuna oral contra la fiebre tifoidea (Oral typhoid vaccine):** (Vivotif[®])
 - **Psoriasis (Psoriasis):** Acitretin (Soriatane[®])
 - **Otros (Other):** Isotretinoin (Accutane[®])

Informe a su médico si está tomando los siguientes medicamentos Tell your doctor if you are taking the following medications

- **Antiarrítmicos (Antiarrhythmics):** Digoxin (Lanoxin[®])
- **Antibióticos (Antibiotics):** Rifampin (Rifadin[®], Rofact[®])
- **Anticoagulantes (Anticoagulants):** Warfarin (Coumadin[®])
- **Anticonvulsivos (Anticonvulsants):** Carbamazepine (Tegretol[®]), Phenytoin (Dilantin[®])
- **Antihipertensivos (Antihypertensive):** Quinapril (Accupril[®])
- **Barbitúricos (Barbituates):** Pentobarbital, Phenobarbital, Secobarbital

Tratamiento con doxiciclina (continuación)

Doxycycline Treatment (cont'd)

Informe a su médico si está tomando los siguientes medicamentos

Tell your doctor if you are taking the following medications

- **Píldoras anticonceptivas (Birth control pills)** (estrógenos/progestágenos)
- **Inmunosupresores (Immunosuppressants):** Methotrexate (Folex[®])
- **Penicilinas (Penicillins)** (Amoxil[®]), Penicillin V (Pen-VK[®])

Efectos secundarios

Side Effects

- Podría experimentar diarrea, náusea, dolor abdominal, vómito, dolor de cabeza o salpullido cutáneo.

Instrucciones para su uso

Instructions for Taking

- Tome una cápsula (100 mg) en la mañana y en la noche con alimentos.
- Tráguese las cápsulas enteras.
- No aplaste, mastique o abra la cápsula.
- Tómela con un vaso completo de agua y manténgase parado/a o sentado/a durante por lo menos 30 minutos.

Instrucciones de almacenaje

Storage Instructions

- Almacenar a temperatura ambiente entre 15 y 30 °C.
- Proteger de la luz, el calor y la humedad.
- No consumir los medicamentos después de la fecha de caducidad impresa.
- Mantener fuera del alcance de los niños.

Instrucciones especiales

Special Instructions

- No tenga relaciones sexuales hasta:
 - una semana después de su tratamiento de 1 día; o
 - que su tratamiento de 7 días haya terminado, y
 - que su(s) pareja(s) sexual(es) también haya(n) recibido tratamiento, aunque los resultados de su prueba hayan sido negativos.
- Hable con su proveedor de atención médica si:
 - tiene relaciones sexuales con una pareja que no haya recibido tratamiento o
 - tiene relaciones sexuales antes de que usted o su(s) pareja(s) terminen el tratamiento.
- Si está usando un método anticonceptivo hormonal (comprimidos orales, aro o parche), use un método anticonceptivo adicional no hormonal (es decir, condón/diafragma) hasta que haya completado su ciclo actual.

Si tiene alguna pregunta o si necesita mayor información, por favor contacte a su médico, unidad local de salud, o vea la información que se encuentra al calce.