

Doxycycline Treatment 強力黴素治療

強力黴素 (Doxycycline) 屬於抗生素，經口服用於治療性病。

過敏 Allergies

- 如果你對任何四環素類抗生素 (Tetracycline antibiotic) 過敏，如：強力黴素 (Doxycycline)、米諾環素 (Minocycline)、或四環素 (Tetracycline) 等，請告訴醫護人員。
- 如果你對亞硫酸鹽 (sulfite, 即防腐劑) 過敏，忌用強力黴素。

懷孕或哺乳期間 Pregnancy/Breastfeeding

- 在懷孕期間，服用強力黴素不安全。
- 在哺乳期間，短期服用強力黴素一般被認為是可以的，即在哺乳期對嬰兒的風險較低。請向醫生諮詢。
- 在哺乳期間，應避免長期服用強力黴素，這是因為嬰兒會透過母乳而間接吸收到這抗生素並在幼兒期呈現毒性 (例如：牙斑、骨骼生長降低)。

注意事項 CAUTION

- 如果你患有重症肌無力 (一種神經肌障礙症) (myasthenia gravis)，請勿服用強力黴素。
- 請注意。本文未列出透過靜脈用藥。如果你正在使用此類藥物，請通知醫護人員。
- 在服用強力黴素時，請勿同時服用補鐵劑 (iron supplements)、補鈣劑 (calcium supplements)、含鋁 (aluminum) 和鎂 (magnesium) 的抗酸藥 (antacids) 或鹼式水楊酸鉍 (Bismuth Subalicylate, 如 Pepto Bismol[®])。在服用這些藥物兩小時之前或服用之後六小時，方可服用強力黴素。
- 避免暴露於陽光下或照射人工紫外線 (太陽燈或日光浴床)。強力黴素會使皮膚變得更敏感，並可能會曬傷。要使用防曬霜 (防曬指數至少為 15)，如果你必須要到戶外陽光下，則要穿衣服保護皮膚。
- 在服用強力黴素時，不可同時服用以下藥物：
 - 口服傷寒疫苗 (Typhoid Vaccine)：(Vivotif[®])
 - 牛皮癬藥 (Psoriasis)：Acitretin (Soriatane[®])
 - 其他藥物：Isotretinoin (Accutane[®])

如果你正在服用以下藥物，請告訴醫生

Tell your doctor if you are taking the following medications

- 抗心律不齊藥 (Antiarrhythmics)：Digoxin (Lanoxin[®])
- 抗生素 (Antibiotics)：Rifampin (Rifadin[®]、Rofact[®])
- 抗凝血劑 (Anticoagulants)：Warfarin (Coumadin[®])



STI/HIV PREVENTION AND CONTROL
STI/HIV CLINIC

BC Centre for Disease Control

An Agency of the Provincial Health Services Authority

REF:109 Last Reviewed by BCCDC Pharmacy on January 2011

第 1 頁共 2 頁

Doxycycline Treatment (cont'd)

强力黴素治療 (續前頁)

如果你正在服用以下藥物，請告訴醫生

Tell your doctor if you are taking the following medications

- 抗驚厥類藥 (Anticonvulsants) : Carbamazepine (Tegretol[®])、Phenytoin (Dilantin[®])
- 抗高血壓藥物 (Antihypertensive) : Quinapril (Accupril[®])
- 巴比妥鹽 (Barbituates) : Pentobarbital、Phenobarbital、Secobarbital
- 避孕藥 (雌激素<Estrogens>, 或黃體素<Progestogens>)
- 免疫抑制劑 (Immunosuppressant) : Methotrexate (Folex[®])
- 盤尼西林(青黴素) (Penicillins) : (Amoxil[®])、Penicillin V (Pen-VK[®])

副作用 Side Effects

- 你可能會出現腹瀉、噁心、腹痛、嘔吐、頭痛或皮疹等徵狀。

服藥說明 Instruction for Taking

- 早晚各服一粒膠囊 (100 毫克)，與食物同服。
- 吞服整粒膠囊。
- 請勿碾碎、咀嚼或打開膠囊。
- 喝一大杯水服藥，並且保持站立或坐直的姿勢至少 30 分鐘。

儲存說明 Storage Instructions

- 存於攝氏 15-30° 之間的室溫。
- 避光、防熱、防潮。
- 不要服用過期的藥物。
- 避免兒童觸及。

特別說明 Special Instructions

- 禁性生活，直至：
 - 在完成一天療程後的一週，或
 - 完成七天的療程，以及
 - 即使你的性伴侶 (們) 測試結果呈陰性，該伴侶 (這些伴侶) 也已接受了治療。
- 如果有以下情況，請告訴醫護人員：
 - 你與未接受治療的伴侶 (們) 有性生活，或
 - 在你或你的性伴侶 (們) 完成治療之前，你有了性生活。
- 如果你正在用荷爾蒙 (口服避孕藥、子宮環或避孕貼片) 方式避孕，另請再用非荷爾蒙避孕方式避孕 (例如：安全套或避孕膜)，直到你現在的週期結束。

如果你有任何疑問或需要更多的信息，請聯絡醫生、本地的醫療機構，或參閱以下聯絡資料。