

Tratamiento con metronidazol Metronidazole Treatment

El metronidazol es un antibiótico oral para el tratamiento de vaginosis bacteriana o infecciones de transmisión sexual.

Alergias Allergies

- Informe a su proveedor de atención médica si tiene alguna alergia al metronidazol (Flagyl®)

Embarazo/Lactancia Pregnancy/Breastfeeding

- El metronidazol no debe usarse durante el primer trimestre (los primeros tres meses) del embarazo, pero puede usarse durante el segundo y tercer trimestres del embarazo.
- El metronidazol puede usarse con cautela durante la lactancia. Por favor consulte a su médico.
- Deje de amamantar durante 12 a 24 horas después de tomar una dosis única de 2 gramos para permitir que todo el medicamento abandone su cuerpo.

ADVERTENCIA CAUTION

- No tome alcohol ni medicamentos que contengan alcohol (p. ej., Nyquil®) durante el tratamiento y durante 48 a 72 horas después de tomar el tratamiento para prevenir los efectos adversos (enrojecimiento, dolor de cabeza, vómito, calambres y sudoración).
- **Tenga en cuenta que los medicamentos intravenosos no están incluidos en este documento. Si está recibiendo algún medicamento administrado por vía intravenosa, avísele a su profesional de la salud.**
- No se pueden tomar los siguientes medicamentos en conjunto con **metronidazol**:
 - **Disulfiram** (Antabuse®),
 - **Medicamentos para el VIH (HIV medication)**: Amprenavir (Agenerase®) solución oral, Lopinavir/Ritonavir (Kaletra®) solución oral; Ritonavir (Norvir®) solución oral; Tipranavir (Aptivus®) cápsulas
 - **Mebendazol** (Vermox®)
 - **Migraña (Migraine)**: Dihydroergotamine (Migranol®), Ergotamine (Cafergot®)
 - **Vacuna oral contra la fiebre tifoidea (Oral typhoid vaccine)** (Vivotif®)

Informe a su médico si está tomando los siguientes medicamentos

Tell your doctor if you are taking the following medications

- **Anticoagulantes (Anticoagulants)**: Warfarin (Coumadin®)
- **Anticonvulsivos (Anticonvulsants)**: Carbamazepine (Tegretol®), Phenytoin (Dilantin®)
- **Barbitúricos (Barbituates)**: Phenobarbital (Donnatal®) Secobarbital (Seconal®)
- **Píldoras anticonceptivas (Birth control pills) (estrógenos/progestágenos)**
- **Quimioterapia para el cáncer (Cancer chemotherapy)**: Busulfan (Myleran®) Fluoruracil
- **Medicamentos para el corazón (Heart medication)**: Amiodarone (Cordarone®)
- **Inmunosupresores (Immunosuppressants)**: Cyclosporine (Neoral®), Mycophenolate Mofetil (CellCept®), Tacrolimus (Prograf®, Protopic®)
- **Psiquiátricos (Psychiatric)**: Lithium (Lithobid®)

Tratamiento con metronidazol (continuación)

Metronidazole Treatment (cont'd)

Informe a su médico si está tomando los siguientes medicamentos:

Tell your doctor if you are taking the following medications:

- **Reductores de ácido estomacal (Stomach acid reducers):** Cimetidine (Tagamet®)
- **Otros (Other):** Cholestyramine resin (Questran®)

Efectos secundarios

Side Effects

- Podría experimentar diarrea, náusea, dolor abdominal, vómito, indigestión, desagradable sabor metálico en la boca o mareo.

Instrucciones para su uso

Instructions for Taking

- El metronidazol puede tomarse con alimentos para disminuir la molestia estomacal.

Instrucciones de almacenaje

Storage Instructions

- Almacenar a temperatura ambiente entre 15 y 30 °C.
- Proteger de la luz, el calor y la humedad.
- No consumir los medicamentos después de la fecha de caducidad impresa.
- Mantener fuera del alcance de los niños.

Instrucciones especiales para el tratamiento de la tricomoniasis

Special Instructions for Treatment of Trichomoniasis

- No tenga relaciones sexuales hasta:
 - una semana después de su tratamiento de 1 día; o
 - que su tratamiento de 7 días haya terminado, y
 - que su(s) pareja(s) sexual(es) también haya(n) recibido tratamiento, aunque los resultados de su prueba hayan sido negativos.
- Hable con su proveedor de atención médica si:
 - tiene relaciones sexuales con una pareja que no haya recibido tratamiento o
 - tiene relaciones sexuales antes de que usted o su(s) pareja(s) terminen el tratamiento.
- Si está usando un método anticonceptivo hormonal (comprimidos orales, aro o parche), use un método anticonceptivo adicional no hormonal (es decir, condón/diafragma) hasta que haya completado su ciclo actual.

Prueba de cura

- Si se usa para la tricomoniasis, hágase otra prueba siete días después de terminar el tratamiento.

Si tiene alguna pregunta o si necesita mayor información, por favor contacte a su médico, unidad local de salud, o vea la información que se encuentra al calce.