

Metronidazole Treatment 甲硝唑治療

甲硝唑 (Metronidazole) 屬於抗生素，經口服用於治療細菌性陰道炎或性病。

過敏 Allergies

- 如果你對甲硝唑 (Flagyl[®]) 過敏，請告訴醫護人員。

懷孕或哺乳期間 Pregnancy/Breastfeeding

- 在懷孕首 3 個月內，應忌用甲硝唑。在孕期的第 2 個和第 3 週期內，可使用此藥。
- 在哺乳期間，可慎用甲硝唑。請向醫生諮詢。
- 在服用 2 克單劑藥之後 12-24 小時內，請停止哺乳，以便讓所有的藥排出體外。

用藥注意事項 CAUTION

- 在治療期和服藥後 48-72 小時內，請勿喝酒或服用含酒精成分的藥物 (例如：Nyquil[®])，以免產生副作用 (潮紅、頭痛、嘔吐、痙攣和出汗)。
- 請注意。本文未列出透過靜脈用藥。如果你正在使用此類藥物，請通知醫護人員。
- 在服用甲硝唑時，不可同時服用以下藥物：
 - 雙硫崙 (Disulfiram 如 Antabuse[®])
 - 抗愛滋病毒藥 (HIV Medication): Amprenavir 口服液 (Agenerase[®])、Lopinavir/Ritonavir 口服液 (Kaletra[®])、Ritonavir 口服液 (Norvir[®])、Tipranavir 膠囊 (Aptivus[®])
 - 甲苯咪唑 (Mebendazole) (Vermox[®])
 - 偏頭痛藥 (Migraine): Dihydroergotamine (Migranol[®])、Ergotamine (Cafergot[®])
 - 口服傷寒疫苗 (Typhoid Vaccine): (Vivotif[®])

如果你正在服用以下藥物，請告訴醫生

Tell your doctor if you are taking the following medications

- 抗凝血劑 (Anticoagulants): Warfarin (Coumadin[®])
- 抗驚厥類藥 (Anticonvulsants): Carbamazepine (Tegretol[®])、Phenytoin (Dilantin[®])
- 巴比妥鹽 (Barbituates): Phenobarbital (Donnatal[®])、Secobarbital (Seconal[®])
- 避孕藥 (Birth Control Pills): (雌激素 <Estrogens>, 或黃體素 <Progestogens>)
- 癌症化療藥 (Cancer Chemotherapy): Busulfan (Myleran[®])、Fluoruracil
- 心臟病藥 (Heart Medication): Amiodarone (Cordarone[®])
- 免疫抑制劑 (Immunosuppressants): Cyclosporine (Neoral[®])、Mycophenolate Mofetil (CellCept[®])、Tacrolimus (Prograf[®])、Protopic[®])

Metronidazole Treatment (cont'd)

甲硝唑治療 (續前頁)

如果你正在服用以下藥物，請告訴醫生

Tell your doctor if you are taking the following medications

- 精神病藥 (Psychiatric) : Lithium (Lithobid®)
- 抗胃酸劑 (Stomach Acid reducers) : Cimetidine (Tagamet®)
- 其他藥物 (Other) : Cholestyramine resin (Questran®)

副作用 Side Effects

- 你可能會出現腹瀉、惡心、腹痛、嘔吐、消化不良、口中有不良的金屬味或頭暈等徵狀。

服藥說明 Instructions for Taking

- 甲硝唑可與食物同服，以減輕胃部不適感。

儲存說明 Storage Instructions

- 存於攝氏 15-30°之間的室溫。
- 避光、防熱、防潮。
- 不要服用過期的藥物。
- 避免兒童觸及。

特別說明 Special Instructions

- 如果你從前是用另一種荷爾蒙（口服避孕藥、子宮環或避孕貼）方式避孕，在上次使用的荷爾蒙避孕方式（口服避孕藥、子宮環或避孕貼）之後的 7 天開始用藥。每次注射用藥物，務必恰好相隔 3 個月。
- 甲孕酮不能預防愛滋病病毒 (HIV) 或其他的性病。
- 如果首次用藥是在正常月經週期的首 5 天內，該藥在注射當天即產生藥效。如果用藥是在該週期稍後的時間內，可能需要 3-4 週後才生效。請多用另一種非荷爾蒙避孕方式（例如：安全套或避孕膜），直到你在的週期結束。

檢測治愈情況 Test of Cure

- 如果用此藥治療滴蟲病 (trichomoniasis)，在完成療程之後的 7 天，請做一次複查。

如果你有任何疑問或需要更多的信息，請聯絡醫生、本地的醫療機構，或參閱以下聯絡資料。