



BC Centre for Disease Control

## STI/HIV PREVENTION AND CONTROL STI/HIV CLINIC

An Agency of the Provincial Health Services Authority

# Tratamiento con espectinomicina Spectinomycin Treatment

La espectinomicina es un antibiótico que se administra mediante una inyección intramuscular para el tratamiento de infecciones de transmisión sexual.

### Alergias Allergies

- Informe a su proveedor de atención médica si tiene alguna alergia a la espectinomicina, aminociclitol, sulfitos o alcohol bencílico.

### Embarazo/Lactancia Pregnancy/Breastfeeding

- **La espectinomicina** puede usarse con cautela durante el embarazo y la lactancia. Por favor consulte a su médico.

### ADVERTENCIA CAUTION

- **No se pueden tomar los siguientes medicamentos en conjunto con espectinomicina:**
  - Vacuna oral contra la fiebre tifoidea (Oral typhoid vaccine) (Vivotif<sup>®</sup>)
- **Tenga en cuenta que los medicamentos intravenosos no están incluidos en este documento. Si está recibiendo algún medicamento administrado por vía intravenosa, avísele a su profesional de la salud.**

### Efectos secundarios Side Effects

- Puede sentir molestia en el lugar donde se aplicó la inyección y experimentar salpullido cutáneo, mareo, náusea, escalofríos, fiebre o dolor de cabeza.

### Cuidados después del tratamiento

- Por favor permanezca en la clínica 15 minutos después de su tratamiento.
- Si tiene alguna reacción después del tratamiento (por ejemplo: salpullido, comezón, dificultad para respirar), por favor avise de inmediato a un miembro del personal.
- Si ocurren estos síntomas después de abandonar la clínica, por favor busque de inmediato ayuda urgente.

### Instrucciones de almacenaje Storage Instructions

- Almacenar a temperatura ambiente entre 15 y 30 °C.
- Proteger de la luz, el calor y la humedad.
- No consumir los medicamentos después de la fecha de caducidad impresa.
- Mantener fuera del alcance de los niños.

# Tratamiento con espectinomycin (continuación)

## Spectinomycin Treatment (cont'd)

### Instrucciones especiales

#### Special Instructions

- No tenga relaciones sexuales hasta:
  - una semana después de su tratamiento de 1 día; o
  - que su tratamiento de 7 días haya terminado, y
  - que su(s) pareja(s) sexual(es) también haya(n) recibido tratamiento, aunque los resultados de su prueba hayan sido negativos.
- Hable con su proveedor de atención médica si:
  - tiene relaciones sexuales con una pareja que no haya recibido tratamiento o
  - tiene relaciones sexuales antes de que usted o su(s) pareja(s) terminen el tratamiento.
- Si está usando un método anticonceptivo hormonal (comprimidos orales, aro o parche), use un método anticonceptivo adicional no hormonal (es decir, condón/diafragma) hasta que haya completado su ciclo actual.

Si tiene alguna pregunta o si necesita mayor información, por favor contacte a su médico, unidad local de salud, o vea la información que se encuentra al calce.