

## Spectinomycin Treatment 大觀黴素治療

大觀黴素 (Spectinomycin) 屬於抗生素，經肌肉注射用於治療性病。

### 過敏 Allergies

- 如果你對大觀黴素(Spectinomycin)、氨基環醇 (aminocyclitol)、亞硫酸鹽 (sulfite) 或苯甲醇 (benzyl alcohol) 等過敏，請告訴醫護人員。

### 懷孕或哺乳期間 Pregnancy/Breast Feeding

- 在懷孕和哺乳期間，可慎用大觀黴素。請向醫生諮詢。

### 注意事項 CAUTION

- 在服用大觀黴素時，不可同時服用以下藥物：
  - 口服傷寒疫苗 (Typhoid vaccine 如 Vivotif®)
- 請注意。本文未列出透過靜脈用藥。如果你正在使用此類藥物，請通知醫護人員。

### 副作用 Side Effects

- 在注射處，你可能會感到不適。也可能出現皮疹、暈眩、噁心、畏寒、發燒或頭痛等徵狀。

### 接受治療後之自我護理 Care of Yourself Following Treatment

- 接受治療之後，請在診所多待 15 分鐘。
- 接受治療之後，如果出現任何反應 (例如：皮疹、瘙癢、呼吸困難等)，請立即告訴醫護人員。
- 離開診所之後，如果出現這些徵狀，請即時尋求緊急醫療援助。

### 儲存說明 Storage Instructions

- 存於攝氏 15-30°之間的室溫。
- 避光、防熱、防潮。
- 不要服用過期的藥物。
- 避免兒童觸及。

### 特別說明 Special Instructions

- 忌性生活，直至：
  - 在完成一天治療後的一週，或
  - 完成七天的治療，以及
  - 即使你的性伴侶 (們) 測試結果呈陰性，該伴侶 (這些伴侶) 仍接受了治療。
- 如果有以下情況，請告訴醫護人員：
  - 你與未接受治療的伴侶 (們) 有性生活，或
  - 在你或你的性伴侶 (們) 完成治療之前，你有了性生活。
- 如果你正在用荷爾蒙 (口服避孕藥、子宮環或避孕貼片) 方式避孕，請另再用非荷爾蒙避孕方式 (例如：安全套或避孕膜)，直到你現在的週期結束。

如果你有任何疑問或需要更多的信息，請聯絡醫生、本地的醫療機構，或參閱以下聯絡資料。