

## Treatment for Syphilis ਸਿਫਲਿਸ (ਆਤਸ਼ਕ) ਦਾ ਇਲਾਜ

ਸਿਫਲਿਸ (ਆਤਸ਼ਕ) ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ Bicillin® L-A (ਪੈਨੀਸੀਲਿਨ G ਬੈਨਜ਼ੋਥੀਨ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ) ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। Bicillin ਇੱਕ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ (ਰੋਗਾਣੂ ਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈ) ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੱਜੇ ਅਤੇ ਖੱਬੇ ਚਿੱਤੜ ਦੇ ਪੱਠਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਟੀਕੇ ਲਗਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਫਲਿਸ ਦੇ ਮੁਢਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਲਈ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ Bicillin ਦੀ ਇੱਕੋ ਖੁਰਾਕ ਢੁਕਵੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਹੈ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ 3 ਹਫ਼ਤੇ Bicillin ਦੇ 2.4 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

### Allergies

#### ਐਲਰਜੀਆਂ

- ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ Penicillin-V-K (ਪੈਨੀਸੀਲਿਨ-ਵੀ-ਕੇ), Amoxicillin (ਐਮੋਕਸੀਸਿਲਿਨ) ਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੈਨੀਸੀਲਿਨ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਜਾਂ Cefixime (ਸੈਫਾਇਕਸਿਮ - Suprax®), Cephalexin (ਸੈਫਾਲੈਕਸਿਨ), Cefaclor (ਸੈਫਾਕਲੋਰ) ਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ cephalosporin (ਸੈਫਲੋਸਪੋਰਿਨ) ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਤੋਂ ਐਲਰਜੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸੋ।

### Pregnancy/Breastfeeding

#### ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ/ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਉਣਾ

- ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿਫਲਿਸ ਦੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
- ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋ ਜਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸੋ।
- ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਸਿਫਲਿਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਿੱਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਣੇਪੇ ਸੰਬੰਧੀ ਪੀੜ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਭਰੂਣ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਖ਼ਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਣਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਔਰਤ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
- ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਵਿੱਚ ਦਬਾਅ ਜਾਂ ਭਰੂਣ ਦੀ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।
- ਦੇਰ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਸਿਫਲਿਸ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਪਰ ਲਿਖੀਆਂ ਗੁੰਝਲਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਹਨ।
- ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਜੀ।

### Treatment Reaction

#### ਇਲਾਜ ਕਾਰਣ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ

- Jarisch-Herxheimer Reaction** (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੁਖਾਰ, ਠੰਢ ਲੱਗਣੀ, ਸਿਰ ਦਰਦ, ਥਕਾਵਟ ਜਾਂ ਸੋਜਸ਼) ਇੱਕ ਆਮ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 4-6 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਘਬਰਾਓ ਨਾ, ਇਹ ਕੋਈ **ਐਲਰਜਿਕ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ** ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
- ਹਰ 4 ਤੋਂ 6 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ Acetaminophen (ਅਸੀਟਾਮਿਨੋਫਿਨ), Aspirin (ਐਸਪ੍ਰਿਨ) ਜਾਂ Ibuprofen (ਆਈਬੂਪ੍ਰੋਫੈਨ) ਲੈਣ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੱਛਣਾਂ ਦੇ ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਹੋਵੇਗੀ।
- ਮੁਢਲੇ ਸਿਫਲਿਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਔਰਤ ਨੂੰ Jarisch-Herxheimer ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
- ਦੇਰ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸਿਫਲਿਸ ਦੇ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ Jarisch-Herxheimer ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

## Treatment for Syphilis (cont'd) ਸਿਫਲਿਸ ਦਾ ਇਲਾਜ (ਚਲਦਾ)

### Care of Yourself Following Treatment

#### ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ

- ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੇ ਗਏ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਇਲਾਜ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰੋ।
- ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ 15 ਮਿੰਟ ਕਲੀਨਿਕ ਵਿੱਚ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ।
- ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ (ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ: ਧੱਫੜ, ਖਾਰਸ਼, ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਤਕਲੀਫ) ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਟਾਫ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਦੱਸੋ।
- ਜੇ ਇਹ ਲੱਛਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕਲੀਨਿਕ ਤੋਂ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ।

### Birth Control

#### ਗਰਭ ਨਿਰੋਧਨ

- ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਰਮੋਨਲ ਕਿਸਮ ਦਾ ਗਰਭ ਨਿਰੋਧਕ (ਮੂੰਹ ਰਾਹੀਂ ਖਾਧੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ, ਰਿੰਗ ਜਾਂ ਪੈਚ) ਵਰਤ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਹਵਾਰੀ ਚੱਕਰ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤਕ ਗਰਭ ਨਿਰੋਧਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੈਰ-ਹਾਰਮੋਨਲ ਤਰੀਕਾ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੰਡੋਮ/ਡਾਇਆਫ੍ਰੈਗਮ) ਵਰਤੋ।

### Blood Donation

#### ਖੂਨ ਦਾਨ ਕਰਨਾ

- ਖੂਨ ਜਾਂ ਅੰਗ ਦਾਨ ਨਾ ਕਰੋ।
- ਕਨੇਡੀਅਨ ਬਲੱਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਵਾਲੇ ਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਖੂਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਖੂਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨਮੂਨੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਸਿਫਲਿਸ ਹੋਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਖੂਨ ਨੂੰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

### EARLY Syphilis Treatment (History of syphilis sore, rash or infection <1 year duration):

#### ਮੁਢਲੇ ਸਿਫਲਿਸ ਦਾ ਇਲਾਜ (ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਸਿਫਲਿਸ ਦਾ ਫੋੜਾ, ਧੱਫੜ ਜਾਂ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ):

### Treatment

#### ਇਲਾਜ

- 2.4 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਨਿਟ Bicillin x 1 (2 ਟੀਕੇ) ਮੁਢਲੀ ਸਿਫਲਿਸ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
- 2.4 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਹਰ ਖੁਰਾਕ ਨੂੰ ਪੱਠਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦੋ ਟੀਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਟੀਕਾ ਸੱਜੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਟੀਕਾ ਖੱਬੇ ਚਿੱਤੜ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
- ਫੋੜੇ ਜਾਂ ਧੱਫੜ ਜਿਹੇ ਸਿਫਲਿਸ ਦੇ ਮੁਢਲੇ ਸੰਕੇਤ ਲਗਭਗ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
- ਜੇ ਇਹ ਲੱਛਣ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ-ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲੋ।

### Special Instructions

#### ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਿਦਾਇਤਾਂ

- ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਤਕ ਸੰਭੋਗ ਨਾ ਕਰੋ।

## Treatment for Syphilis (cont'd) ਸਿਫਲਿਸ ਦਾ ਇਲਾਜ (ਚਲਦਾ)

### Follow up Testing

#### ਇਲਾਜ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਲਈ ਜਾਂਚ

- ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੇਵੇਂ ਅਤੇ ਬਾਰ੍ਹਵੇਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਇਲਾਜ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਲਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
- ਐੱਚ.ਆਈ.ਵੀ. ਪੌਜ਼ਟਿਵ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਤੋਂ 3, 6, 9 ਅਤੇ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਇਲਾਜ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਲਈ ਖੂਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
- ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਰੋਗਨਾਸ਼ਕ ਅੰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪੱਧਰ ਜਾਂ ਆਰ.ਪੀ.ਆਰ. ਅਨੁਪਾਤ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਉਪਰੰਤ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਘਟ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
- ਜੇ ਆਰ.ਪੀ.ਆਰ. ਅਨੁਪਾਤ ਉਚਿਤ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਘਟਦਾ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

### Partner Notification and Follow-up

#### ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਅਤੇ ਪੈਰਵੀ

- ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਹ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਇਤਲਾਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੋਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਣ ਜਾਂ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰਕ ਸੰਬੰਧ ਰਹੇ ਹਨ।
- ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰਕ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਨਾ ਵੀ ਹੋਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਿਫਲਿਸ ਦਾ ਛੁਤਗ੍ਰਸਤ ਵਿਅਕਤੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
- ਸਰੀਰਕ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ, ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਸਿਫਲਿਸ ਦੇ ਛੁਤਗ੍ਰਸਤ ਵਿਅਕਤੀ ਵਜੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

### LATE Syphilis Treatment (>1 year duration or Syphilis of Unknown Duration):

ਸਿਫਲਿਸ ਦਾ ਦੇਰ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਇਲਾਜ (1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੋਈ ਸਿਫਲਿਸ ਜਾਂ ਅਣਪਛਾਤੀ ਅਵਧੀ ਦੀ ਸਿਫਲਿਸ):

### Treatment

#### ਇਲਾਜ

- 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਕਫੇ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ 2.4 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਨਿਟ Bicillin ਦੀਆਂ 3 ਖੁਰਾਕਾਂ
- 2.4 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਹਰ ਖੁਰਾਕ ਨੂੰ ਪੱਠਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦੋ ਟੀਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਟੀਕਾ ਸੱਜੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਟੀਕਾ ਖੱਬੇ ਚਿੱਤੜ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
- ਜਦੋਂ ਤਕ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਖੁਰਾਕਾਂ ਵਿਚਲੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਕਫੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਸੰਬੰਧੀ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਸਮਾਂ-ਸੂਚੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਕਲੀਨਿਕੀ ਅੰਕੜੇ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹਨ।

### Special Instructions

#### ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਿਦਾਇਤਾਂ

- ਸਿਫਲਿਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤਕ ਸੰਭੋਗ ਨਾ ਕਰੋ।

### Follow up Testing

#### ਇਲਾਜ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਲਈ ਜਾਂਚ

- ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਲਈ ਸਿਫਲਿਸ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਵਾਸਤੇ ਖੂਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
- ਤੁਹਾਡੇ ਆਖ਼ਰੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰੇਗਾ।

## Treatment for Syphilis (cont'd) ਸਿਫਲਿਸ ਦਾ ਇਲਾਜ (ਚਲਦਾ)

### Partner Notification and Follow-up

#### ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਅਤੇ ਪੈਰਵੀ

- ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਕੋਈ ਅਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਸਰੀਰਕ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
- ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਸਰੀਰਕ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ RPR (ਆਰ.ਪੀ.ਆਰ.), TPPA (ਟੀ.ਪੀ.ਪੀ.ਏ.) ਅਤੇ FTA-ABS (ਐੱਫ.ਟੀ.ਏ.-ਏ.ਬੀ.ਐੱਸ.) ਲਈ ਖੂਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ।

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹਨ ਜਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਸਿਹਤ ਯੂਨਿਟ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਜਾਂ ਹੇਠ ਲਿਖੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਖੋ।